n.° 19. ~~44~~

observation sur la division de l'olecrane faite par un Instrument tranchant par M. gaiguiere M.tre en chirurgie, Lieutenant de cn.ᵉ ~~de~~ 1.er chirurgien du Roy et chirurgien en chef de l'hotel-dieu à laon

Le dix huit aoust de l'année 1759 Je fus mandé chez M.r Barthelemy Sculteur à laon, pour y voir un de ses Compagnons nommé lavol; Il avoit une playe transversale à la partie superieure, posterieure et interne du Cubitus droit, de la longueur de deux bons pouces et demie penetrante dans l'articulation avec avec fracture de l'apophyse du cubitus appelée olecrane. L'ayant Interrogé de la cause de l'accident Il me dit qu'en se battant Contre un particulier, qu'a l'instant qu'il avoit le bras levé pour luy porter un Coup de canne sur la teste, son adversaire qui etoit armé d'un Couteau de chasse luy en avoit detaché un Coup si violent que la manche de son habit et de sa veste l'un et l'autre de drap, etoient Coupé; que la lame du Couteau de chasse etoit Cassée en plusieurs pieces ce que Je ~~[illegible]~~ verifiai elle etoit Cassée dans le milieu, et dans le manche et ce qu'on nomme la soie, apres quoi Je lai pancé, et saigné deux fois le meme Jour, Je luy prescrivis pour boisson une eau de chiendent et de reglisse, et pour bouillon de l'eau de veau; le lendemain Il fut re saigné plusieurs fois à Cause de la douleur, de la fievre, et de la tension survenue au bras et à l'avant bras, Je pançai la plaie avec le baume d'arceus etendu sur de la charpie après trempée dans l'eau vulneraire, Je mis par dessus pour emplatre de meme baume etendu sur du linge; Je fis aussi des fomentations emollientes sur les parties douloureuses. Malgrés ces precautions le volume que le bras acquit par le gonflement, la situation de la plaie rendoient

ARC 41 n.° 96

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

les pançemens difficiles et douloureux. Il étoit même impossible de ne pas ebranler, à chaque pancement, la piece separée du cubitus, et de ne pas tirailler les membranes capsulaires de l'articulation divisées, pour y obvier, et les rendre plus commodes je fis faire un chassi en bois, un peu coudé, assez long pour y placer le bras, l'avant bras et la main, je fis arranger une planche en dessous, qui avoit des degrés de repos, et à l'extremité anterieure du chassi j'avois fais attacher en dessous une palette qui s'engageoit dans les degrés du repos de la planche ce qui imitoit assez bien une cremaillere, apres quoi je fis garnir le chassis d'un bon coutil, je le fendrai à l'endroit ou devoit passer le condyle interne; tout etant disposé je plaçai dessus l'extremité blessée, je logai le condyle dans l'ouverture faite au coutil à travers la quelle je decouvrois aisement la playe, je donnai ensuite à l'avant bras, une situation qui approchoit de la demie flexion, je garnis ensuite le dedans de la main d'une palette pour l'empecher de se porter trop en dessous. par ce procedé la fracture s'est trouvée enclavée de façon qu'elle ne pouvoit s'ecarter de son principe. je pouvois à l'aide de la palette elever le chassis, autant qu'il m'etoit necessaire pour les pancemens sans exciter le moindre tiraillement aux parties divisées: j'elevai aussi par son moyen, la main, et l'avant bras autant qu'il etoit necessaire pour favoriser le retour des liqueurs.

le bras ainsi placé dans un espece de brancard fit que la playe ne souffrit en rien.

les grands accidens dissipés j'ai simplifié le rendu darres les

pancemens, je ne les ai repeté qu'autant que l'ecoulement sinovial
etoit trop abondant et que son sejour auroit pu nuire à la
playe, apres un mois de traitement j'ai fais faire au blessé
quelques petits mouvemens de flexion et de extension tres
menagés, je ne les augmentai qu'à mesure que je pouvais
les faire sans risque. par ce moyen j'ai divisé la sinovie qui
tend toujours à s'epaissir quand elle sejourne, ce qui n'a peu
contribué à luy conserver le mouvement de l'avant bras avec
le bras. de sorte que le sujet qui fait l'objet de l'observation peut
porter l'extension de l'avant bras, quelque chose au delà des
deux tiers, la flexion est à volonté, ainsi que les mouvemens de
pronation et de supination ce qu'il a obtenu apres deux mois de
pancemens, terme qu'il a fallu pour completter la guerison,
Il est actuellement etabli à Rheims ou il travaille sans
ressentir de douleur ce qu'il m'a assuré dans differentes
occasions ou je l'ai vu